

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)(毒)アブラキサン注100mg	125mg/m2	132mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)ゲムシタビン点滴静注「ヤルト」	1000mg/m2	1050mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 臍GEM+nabPTX 3W1R 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【1番目】							【1番目】	
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 臍GEM+nabPTX 3W1R 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【2番目】							【2番目】	
03	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)アブラキサン注100mg 療法名:消 臍GEM+nabPTX 3W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【3番目】							【3番目】	
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 臍GEM+nabPTX 3W1R 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【4番目】							【4番目】	
05	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ゲムシタビン点滴静注「ヤルト」 療法名:消 臍GEM+nabPTX 3W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【5番目】							【5番目】	
06	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 臍GEM+nabPTX 3W1R 点滴: *点滴時間 15分で	1本	【6番目】							【6番目】	

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 臍GEM+nabPTX 3W1R 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V						【1番目】			
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 臍GEM+nabPTX 3W1R 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【2番目】			
03	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)アブラキサン注100mg 療法名:消 臍GEM+nabPTX 3W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【3番目】			
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 臍GEM+nabPTX 3W1R 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本						【4番目】			
05	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ゲムシタピン点滴静注「ヤクルト」 療法名:消 臍GEM+nabPTX 3W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【5番目】			
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 臍GEM+nabPTX 3W1R 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本						【6番目】			