消内　**レジメン名称**：消 大腸CPT+Cape[XELIRI]+Bev　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)アバスチン	7.5mg/kg	9mg/kg
04	点滴抗癌剤	(癌)イリノテカン塩酸塩注「ﾀｲﾎｳ」	180mg/m2	189mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸CPT+Cape[XELIRI]+Bev 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:消 大腸CPT+Cape[XELIRI]+Bev 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml アロキシ注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸CPT+Cape[XELIRI]+Bev 点滴: ＊点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)イリノテカン塩酸塩注「ﾀｲﾎｳ」 療法名:消 大腸CPT+Cape[XELIRI]+Bev 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸CPT+Cape[XELIRI]+Bev 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								