乳腺　**レジメン名称**：乳 乳腺MTX+5FU+CPApo[CMF] 2W2R　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 点滴抗癌剤 | (癌)メソトレキセート | 40mg/m2 | 48mg/m2 |
| 03 | 点滴抗癌剤 | (癌)フルオロウラシル注 | 500mg/m2 | 600mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>ｵﾝﾀﾞﾝｾﾄﾛﾝ注射液(4mg)2mL「ｻﾝﾄﾞ」<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>療法名:乳 乳腺MTX+5FU+CPApo[CMF] 2W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>1A<br>1V | 【１番目】 | | | | | | | 【１番目】 | |
| 02 | 点滴抗癌剤 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>(癌)メソトレキセート<br>療法名:乳 乳腺MTX+5FU+CPApo[CMF] 2W2R<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | 【２番目】 | | | | | | | 【２番目】 | |
| 03 | 点滴抗癌剤 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>(癌)フルオロウラシル注<br>療法名:乳 乳腺MTX+5FU+CPApo[CMF] 2W2R<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | 【３番目】 | | | | | | | 【３番目】 | |
| 04 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>療法名:乳 乳腺MTX+5FU+CPApo[CMF] 2W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本 | 【４番目】 | | | | | | | 【４番目】 | |