産婦　**レジメン名称**：婦 頸部CDDPshort+NGT q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ハイカムチン注1.1mg	0.75mg/m2	0.79mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	50mg/m2	53mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3						
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 頸部CDDPshort+NGT q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】	【１番目】	【１番目】						
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ハイカムチン注1.1mg 療法名:婦 頸部CDDPshort+NGT q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】	【２番目】	【２番目】						
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 頸部CDDPshort+NGT q3W 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】	【３番目】	【３番目】						
04	点滴	ソルデム３A輸液500ml アロキシ注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:婦 頸部CDDPshort+NGT q3W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 1A 1.5V 1本	【４番目】								
05	点滴	20%マンニットール注射液 300mL 療法名:婦 頸部CDDPshort+NGT q3W 点滴: ＊点滴時間 35分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								
06	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:婦 頸部CDDPshort+NGT q3W	500ml 0mg	【６番目】								

産婦　**レジメン名称**：婦 頸部CDDPshort+NGT q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3						
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】： ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
07	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:婦 頸部CDDPshort+NGT q3W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【７番目】								