

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | | | | | |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml ファモチジン注用20mg 「トーワ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 骨髓腫 ERD 2nd 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より | 1本 1A 1V | | | | 【1番目】 | | | | | |
| 02 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髓腫 ERD 2nd 点滴: *点滴時間 45分で 投与経路:主管より | 1本 | | | | 【2番目】 | | | | | |
| 03 | 点滴抗癌剤 | 生理食塩液250ml(テルモ) (癌)エムプリシティ点滴静注用 注射用水20ml 療法名:血 骨髓腫 ERD 2nd 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 300mL/h 投与経路:主管より | 230ml 0mg 2A | | | | 【3番目】 | | | | | |
| 04 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 骨髓腫 ERD 2nd 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より | 1本 | | | | 【4番目】 | | | | | |