

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|----|-------|--------------------|---------|---------|
| 02 | 点滴抗癌剤 | (癌)イリノテカン塩酸塩注「タイセ」 | 40mg/m2 | 48mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | | | | | | |
|----|-------|--|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml ラモトリオン塩酸塩注射液 (0.3mg) 2mL 「EMEC」 療法名:血リンパ腫CPTdays q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より | 1本 1A | 【1番目】 | 【1番目】 | 【1番目】 | | | | | | |
| 02 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖液250ml (癌)イリノテカン塩酸塩注「タイセ」 療法名:血リンパ腫CPTdays q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より | 1本 0mg | 【2番目】 | 【2番目】 | 【2番目】 | | | | | | |
| 03 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml 療法名:血リンパ腫CPTdays q3W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より | 1本 | 【3番目】 | 【3番目】 | 【3番目】 | | | | | | |