

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)エンドキサン注射用	400mg/m2	480mg/m2
03	点滴抗癌剤	(癌)エトポシド点滴注(100mg)5mL「サト」	40mg/m2	48mg/m2
03	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」	10mg/m2	12mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5				
01	点滴	アロキシン注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髓腫(入) DCEP 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:ルート①	1A 6V 1本	12:30			12:30					
02	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL 大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髓腫(入) DCEP 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:ルート①	6V 1本		12:30	12:30						
03	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)エンドキサン注射用 (癌)エトポシド点滴注(100mg)5mL「サト」 (癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」 療法名:血 骨髓腫(入) DCEP 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 24時間で 投与経路:ルート②	1袋 0mg 0mg 0mg	13:00	13:00	13:00	13:00					
04	点滴	ソルデム 3A輸液500ml 療法名:血 骨髓腫(入) DCEP 点滴: *点滴時間 8時間で 投与経路:ルート①	1本	3回	3回	3回	3回					
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 骨髓腫(入) DCEP 点滴: *点滴時間 150分で 投与経路:ルート②	1本					13:00				