

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ハラヴェン注(1mg)2ml	1.4mg/m2	1.7mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)エンドキサン注射用	600mg/m2	720mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml アロキン注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+CPA(q3W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V	【1番目】							
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+CPA(q3W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V								【1番目】
03	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌)(毒)ハラヴェン注(1mg)2ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+CPA(q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2番目】							【2番目】
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+CPA(q3W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】							【3番目】
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)エンドキサン注射用 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+CPA(q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【4番目】							
06	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+CPA(q3W)	1本	【5番目】							

