

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)サイラムザ点滴静注液	8mg/kg	8.4mg/kg
05	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルNK	80mg/m2	84mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注用20mg「トーワ」 生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胃PTX(3W1R)+Ramucirumab(q2W)1st,2nd 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1V 1A 1A 1本	【1番目】							【1番目】	
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 胃PTX(3W1R)+Ramucirumab(q2W)1st,2nd 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【2番目】							【2番目】	
03	点滴抗癌剤	(癌)サイラムザ点滴静注液 生理食塩液250ml(テルモ) 療法名:消 胃PTX(3W1R)+Ramucirumab(q2W)1st,2nd 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【3番目】								
04	点滴	生理食塩液250ml(テルモ) 療法名:消 胃PTX(3W1R)+Ramucirumab(q2W)1st,2nd 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【4番目】								
05	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルNK 5%大塚糖液250ml 療法名:消 胃PTX(3W1R)+Ramucirumab(q2W)1st,2nd 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【5番目】							【3番目】	
06	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胃PTX(3W1R)+Ramucirumab(q2W)1st,2nd	1本	【6番目】							【4番目】	

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注用20mg「トーワ」 生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胃PTX(3W1R)+Ramucirumab(q2W)1st, 2nd 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1V 1A 1A 1本						【1番目】			
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 胃PTX(3W1R)+Ramucirumab(q2W)1st, 2nd 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本						【2番目】			
03	点滴抗癌剤	(癌)サイラムザ点滴静注液 生理食塩液250ml(テルモ) 療法名:消 胃PTX(3W1R)+Ramucirumab(q2W)1st, 2nd 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1本						【3番目】			
04	点滴	生理食塩液250ml(テルモ) 療法名:消 胃PTX(3W1R)+Ramucirumab(q2W)1st, 2nd 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本						【4番目】			
05	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルNK 5%大塚糖液250ml 療法名:消 胃PTX(3W1R)+Ramucirumab(q2W)1st, 2nd 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1本						【5番目】			
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胃PTX(3W1R)+Ramucirumab(q2W)1st, 2nd 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本						【6番目】			