消内　**レジメン名称**：消 大腸mFOLFOX6+Pani q2W　**インターバル日数**：12 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ベクティビックス点滴注(100mg)5ml	6mg/kg	7.2mg/kg
05	点滴	(癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」	200mg/m2	240mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)オキサリプラチン点滴静注	85mg/m2	102mg/m2
07	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	400mg/m2	480mg/m2
09	バルン型持続注入	(癌)フルオロウラシル注	2400mg/m2	3150mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸mFOLFOX6+Pani q2W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ベクティビックス点滴注(100mg)5ml 療法名:消 大腸mFOLFOX6+Pani q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 大腸mFOLFOX6+Pani q2W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml アロキシ注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸mFOLFOX6+Pani q2W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V	【４番目】								
05	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:消 大腸mFOLFOX6+Pani q2W 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:側管より	1本 0mg	【５番目】								
	＜次ページあり＞											

消内　**レジメン名称**：消 大腸mFOLFOX6+Pani q2W　**インターバル日数**：12 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)オキサリプラチン点滴静注 療法名:消 大腸mFOLFOX6+Pani q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【６番目】								
07	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 大腸mFOLFOX6+Pani q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【７番目】								
08	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸mFOLFOX6+Pani q2W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【８番目】								
09	バルン型持続注入	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)フルオロウラシル注 ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N(5000U)5ml 療法名:消 大腸mFOLFOX6+Pani q2W バルン型持続注入【薬剤部混合】: ＊点滴時間 46時間で 投与経路:主管より ： 注入器具ﾊﾞｸｽﾀｰｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ(2ml	1本 0mg 2ml	【９番目】								