

消内 レジメン名称 : 消 大腸FLOX q8W

インターバル日数 : 54 日 基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)オキサリプラチン点滴静注	85mg/m2	90mg/m2
04	点滴	(癌)レボホリナート点滴静注用「ヤルト」	125mg/m2	132mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	500mg/m2	525mg/m2
07	点滴	(癌)レボホリナート点滴静注用「ヤルト」	125mg/m2	132mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml アロキン注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V	【1番目】								
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)オキサリプラチン点滴静注 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 0mg 0.25ml	【2番目】								
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V								【1番目】	
04	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ヤルト」 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【3番目】							【2番目】	
05	点滴抗癌剤  <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】:	1本 0mg	【4番目】							【3番目】	



RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml アロキン注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V						【1番目】			
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)オキサリプラチン点滴静注 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 0mg 0.25ml						【2番目】			
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V									
04	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ヤルト」 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【3番目】			
05	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【4番目】			
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【5番目】			
07	点滴 <次ページあり>	5%大塚糖液250ml	1本						【6番目】			



RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml アロキン注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V									
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)オキサリプラチン点滴静注 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 0mg 0.25ml									
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V				【1番目】					
04	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ヤルト」 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg				【2番目】					
05	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg				【3番目】					
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 大腸FLOX q8W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本				【4番目】					
07	点滴 <次ページあり>	5%大塚糖液250ml	1本				【5番目】					





