

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
04	点滴抗癌剤	(癌)アービタックス注(100mg)20ml	400mg/m2	480mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)イリノテカン塩酸塩注「タイバ」	150mg/m2	180mg/m2
07	点滴抗癌剤	(癌)アービタックス注(100mg)20ml	250mg/m2	300mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8
01	点滴	グラセトン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注用20mg「トーワ」 療法名:消 大腸CPT(q2W)+Cet(Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1袋 1V 1A 1A	【1番目】							
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注用20mg「トーワ」 療法名:消 大腸CPT(q2W)+Cet(Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A 1A								【1番目】
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 大腸CPT(q2W)+Cet(Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【2番目】							【2番目】
04	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)アービタックス注(100mg)20ml 療法名:消 大腸CPT(q2W)+Cet(Weekly) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【3番目】							
05	点滴 <次ページあり>	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 大腸CPT(q2W)+Cet(Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 60分で	1本	【4番目】							

