産婦　**レジメン名称**：婦 卵巣DOC(2W1R)+Bev(q3W)　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)アバスチン	15mg/kg	18mg/kg
05	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」	40mg/m2	42mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 卵巣DOC(2W1R)+Bev(q3W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:婦 卵巣DOC(2W1R)+Bev(q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 卵巣DOC(2W1R)+Bev(q3W) 点滴: ＊点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本 1V	【３番目】								
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 卵巣DOC(2W1R)+Bev(q3W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V								【１番目】	
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」 療法名:婦 卵巣DOC(2W1R)+Bev(q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】							【２番目】	
06	点滴 ＜次ページあり＞	5%大塚糖液250ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 卵巣DOC(2W1R)+Bev(q3W)	1本 0.5V	【５番目】							【３番目】	

産婦　**レジメン名称**：婦 卵巣DOC(2W1R)+Bev(q3W)　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
		点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より										