

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|----|-------|-----------------------|---------|------------|
| 03 | 点滴抗癌剤 | (癌)パクリタキセルNK | 80mg/m2 | 84mg/m2 |
| 04 | 点滴抗癌剤 | (癌)カルボプラチンNK注 | 2 (AUC) | 2. 1 (AUC) |
| 07 | 点滴抗癌剤 | (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 | 4mg/kg | 4. 8mg/kg |
| 10 | 点滴抗癌剤 | (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 | 2mg/kg | 2. 4mg/kg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 |
|----|--------------------|--|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6. 6mg) 2mL ファモチジン注用20mg 「トーフ」 ポララミン注(5mg) 1mL 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (3W1R)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より | 1本 1V 1A 1A | 【1番目】 | | | | | | | 【1番目】 | |
| 02 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL ラモトロン塩酸塩注射液 (0. 3mg) 2mL 「EMEC」 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (3W1R)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より | 1本 1A | 【2番目】 | | | | | | | 【2番目】 | |
| 03 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルNK 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (3W1R)+HCPT (Weekly) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より | 1本 0mg | 【3番目】 | | | | | | | 【3番目】 | |
| 04 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (3W1R)+HCPT (Weekly) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より | 1本 0mg | 【4番目】 | | | | | | | 【4番目】 | |
| 05 | 点滴 <次ページあり> | 5%糖液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (3W1R)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 10分で | 1本 | 【5番目】 | | | | | | | 【5番目】 | |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | | | | | |
|----|-------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | | 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA(3W1R)+HCPT(Weekly)1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より | 1A | | | | | | | | | |
| 08 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA(3W1R)+HCPT(Weekly)1st 点滴: *点滴時間 20分で 投与経路:主管より | 1本 | | | | | | | | | |
| 09 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA(3W1R)+HCPT(Weekly)1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より | 1本 | | | | 【1番目】 | | | | | |
| 10 | 点滴抗癌剤 | 生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA(3W1R)+HCPT(Weekly)1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より | 1本 0mg 1A | | | | 【2番目】 | | | | | |
| 11 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA(3W1R)+HCPT(Weekly)1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より | 1本 | | | | 【3番目】 | | | | | |