消内　**レジメン名称**：消 大腸FOLFOXIRI+Bev q2W　**インターバル日数**：12 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)アバスチン	5mg/kg	5.3mg/kg
04	点滴抗癌剤	(癌)イリノテカン塩酸塩注「ﾀｲﾎｳ」	165mg/m2	173mg/m2
06	点滴	(癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」	200mg/m2	210mg/m2
07	点滴抗癌剤	(癌)オキサリプラチン点滴静注	85mg/m2	89mg/m2
09	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	3200mg/m2	3360mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸FOLFOXIRI+Bev q2W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	(癌)アバスチン 大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 大腸FOLFOXIRI+Bev q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキシ注0.75mg ブスコパン注(20mg)1ml 療法名:消 大腸FOLFOXIRI+Bev q2W 点滴: ＊点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本 1.5V 1A 1A	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	(癌)イリノテカン塩酸塩注「ﾀｲﾎｳ」 5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ 療法名:消 大腸FOLFOXIRI+Bev q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【４番目】								
05	点滴 ＜次ページあり＞	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸FOLFOXIRI+Bev q2W 点滴: ＊点滴時間 10分で	1本	【５番目】								

消内　**レジメン名称**：消 大腸FOLFOXIRI+Bev q2W　**インターバル日数**：12 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		投与経路:主管より										
06	点滴	(癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」 5%大塚糖液250ml 療法名:消 大腸FOLFOXIRI+Bev q2W 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:側管より	0mg 1本	【６番目】								
07	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)オキサリプラチン点滴静注 療法名:消 大腸FOLFOXIRI+Bev q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【７番目】								
08	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸FOLFOXIRI+Bev q2W 点滴: ＊点滴時間 20分で 投与経路:主管より	1本	【８番目】								
09	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注 ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N(5000U)5ml 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸FOLFOXIRI+Bev q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 48時間で 投与経路:主管より ： 注入器具ﾊﾞｸｽﾀｰｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ(2ml	0mg 2ml 1本	【９番目】								