消内　【胃癌 】　レジメン名称：消 胃FOLFOX+Nivo q2W　　インターバル日数：12 日 基準日：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)オプジーボ点滴静注	240mg	240mg
05	点滴	(癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」	200mg/m2	240mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)オキサリプラチン点滴静注	85mg/m2	90mg/m2
07	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	400mg/m2	420mg/m2
09	バルン型持続注入	(癌)フルオロウラシル注	2400mg/m2	3150mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1							
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 胃FOLFOX+Nivo q2W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】							
02	点滴抗癌剤	生食注 100mL テルモ (癌)オプジーボ点滴静注 療法名:消 胃FOLFOX+Nivo q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】							
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 胃FOLFOX+Nivo q2W 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】							
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「ﾀｲﾎｳ」 療法名:消 胃FOLFOX+Nivo q2W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1V	【４番目】							
05	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:消 胃FOLFOX+Nivo q2W 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:側管より	1本 0mg	【５番目】							

消内　【胃癌 】　レジメン名称：消 胃FOLFOX+Nivo q2W　インターバル日数：12 日 基準日：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)オキサリプラチン点滴静注 療法名:消 胃FOLFOX+Nivo q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【６番目】								
07	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 胃FOLFOX+Nivo q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【７番目】								
08	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 胃FOLFOX+Nivo q2W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【８番目】								
09	バルン型持続注入	大塚生食注2ポート100mL ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N(5000U)5ml (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 胃FOLFOX+Nivo q2W バルン型持続注入【薬剤部混合】: ＊点滴時間 46時間で 投与経路:主管より ： 注入器具ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ(3.7m	1本 2ml 0mg	【９番目】								