消内　【大腸癌 】 レジメン名称：消 大腸Ox+CPT q3W　　インターバル日数：19 日 基準日：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)オキサリプラチン点滴静注	130mg/m2	137mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)イリノテカン塩酸塩点滴静注液「NK」	175mg/m2	184mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「ﾀｲﾎｳ」 療法名:消 大腸Ox+CPT q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1V	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)オキサリプラチン点滴静注 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸Ox+CPT q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 0mg 0.25ml	【２番目】								
03	点滴	5%糖液キットH 50mL ブスコパン注(20mg)1ml 療法名:消 大腸Ox+CPT q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 1A	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)イリノテカン塩酸塩点滴静注液「NK」 療法名:消 大腸Ox+CPT q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸Ox+CPT q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								