呼内　**【非小細胞 】レジメン名称**：呼 非小細胞CBDCA+S-1+Bev q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ベバシズマブBS点滴静注「ﾌｧｲｻﾞｰ」	15mg/kg	18mg/kg
05	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	5(AUC)	5.3(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1							
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+S-1+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】							
02	点滴抗癌剤	生食注 100mL テルモ (癌)ベバシズマブBS点滴静注「ﾌｧｲｻﾞｰ」 療法名:呼 非小細胞CBDCA+S-1+Bev q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】							
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+S-1+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】							
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL グラニセトロン静注液(3mg)3ml「NK」 療法名:呼 非小細胞CBDCA+S-1+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A	【４番目】							
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+S-1+Bev q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【５番目】							
06	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+S-1+Bev q3W 点滴:	1本	【６番目】							

呼内　【非小細胞 】レジメン名称：呼 非小細胞CBDCA+S-1+Bev q3W　インターバル日数：19 日 基準日：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より										