産婦　【体部 】　レジメン名称：婦 体部CDDPshort+DOC q3W　インターバル日数：19 日 基準日：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」	70mg/m2	74mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	60mg/m2	63mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 体部CDDPshort+DOC q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【１番目】
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」 療法名:婦 体部CDDPshort+DOC q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】
03	点滴	5%大塚糖液250ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 体部CDDPshort+DOC q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0.5V	【３番目】
04	点滴	ソルデム３A輸液500ml 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「ﾀｲﾎｳ」 療法名:婦 体部CDDPshort+DOC q3W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 1本 1V	【４番目】
05	点滴	20%マンニットール注射液 300mL 療法名:婦 体部CDDPshort+DOC q3W 点滴: ＊点滴時間 35分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】
06	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	400ml 0mg	【６番目】

印刷日時　2022-06-14 14:05:35

産婦　**【体部 】**　**レジメン名称**：婦 体部CDDPshort+DOC q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		療法名:婦 体部CDDPshort+DOC q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
07	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:婦 体部CDDPshort+DOC q3W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【７番目】								