消内　**【大腸癌 】**　**レジメン名称**：消 大腸XELOXIRI+Bev q3W　　**インターバル日数**：19 日　**基準日**：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ベバシズマブBS点滴静注｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣	7.5mg/kg	9mg/kg
04	点滴抗癌剤	(癌)イリノテカン塩酸塩点滴静注液「NK」	150mg/m2	189mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)オキサリプラチン点滴静注	100mg/m2	105mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸XELOXIRI+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	生食注 100mL テルモ (癌)ベバシズマブBS点滴静注｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 療法名:消 大腸XELOXIRI+Bev q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml グラニセトロン静注液(3mg)3ml｢NK｣ デキサート注射液(6.6mg)2mL ブスコパン注(20mg)1ml 療法名:消 大腸XELOXIRI+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V 1A	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)イリノテカン塩酸塩点滴静注液「NK」 療法名:消 大腸XELOXIRI+Bev q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸XELOXIRI+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ	1本	【６番目】								

消内　【大腸癌 】 レジメン名称：消 大腸XELOXIRI+Bev q3W　　インターバル日数：19 日 基準日：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		(癌)オキサリプラチン点滴静注 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸XELOXIRI+Bev q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	0mg 0.25ml									
07	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:消 大腸XELOXIRI+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【７番目】								