

体表面積計算式: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184
 使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
04	点滴抗癌剤	(癌)サークリサ点滴静注	10mg/kg	12mg/kg
05	点滴抗癌剤	(癌)サークリサ点滴静注	10mg/kg	12mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	アセリオ静注液(1000mg)100mLバッグ 療法名:+血 骨髓腫 Isa(Weekly)-Pd(3W1R) 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1袋	【1番目】							【1番目】	
02	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL パラミン注(5mg)1mL ファモチジン注射液(20mg)2mL「トーワ」 大塚生食注2ポート100mL 療法名:+血 骨髓腫 Isa(Weekly)-Pd(3W1R) 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	6V 1A 1A 1本	【2番目】							【2番目】	
03	点滴	生食溶解液キットH 50mL 療法名:+血 骨髓腫 Isa(Weekly)-Pd(3W1R) 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】							【3番目】	
04	点滴抗癌剤	(癌)サークリサ点滴静注 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 療法名:+血 骨髓腫 Isa(Weekly)-Pd(3W1R) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 88mL/h 投与経路:主管より	0mg 1本	【4番目】								
05	点滴抗癌剤	(癌)サークリサ点滴静注 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 療法名:+血 骨髓腫 Isa(Weekly)-Pd(3W1R) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 88mL/h 投与経路:主管より	0mg 1本								【4番目】	
06	点滴	生食溶解液キットH 50mL 療法名:+血 骨髓腫 Isa(Weekly)-Pd(3W1R) 1st	1本	【5番目】							【5番目】	

血液 【骨髓腫】 レジメン名称 : +血 骨髓腫 Isa(Weekly)-Pd(3W1R) 1st

インターバル日数 : 26 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22						
01	点滴	アセリオ静注液(1000mg)100mLバッグ 療法名:+血 骨髓腫 Isa(Weekly)-Pd(3W1R) 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1袋				【1番目】						
02	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注射液(20mg)2mL「トーフ」 大塚生食注2ポート100mL 療法名:+血 骨髓腫 Isa(Weekly)-Pd(3W1R) 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	6V 1A 1A 1本				【2番目】						
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:+血 骨髓腫 Isa(Weekly)-Pd(3W1R) 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本				【3番目】						
04	点滴抗癌剤	(癌)サークリサ点滴静注 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 療法名:+血 骨髓腫 Isa(Weekly)-Pd(3W1R) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 88mL/h 投与経路:主管より	0mg 1本										
05	点滴抗癌剤	(癌)サークリサ点滴静注 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 療法名:+血 骨髓腫 Isa(Weekly)-Pd(3W1R) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 88mL/h 投与経路:主管より	0mg 1本				【4番目】						
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:+血 骨髓腫 Isa(Weekly)-Pd(3W1R) 1st 点滴: *点滴時間 40分で 投与経路:主管より	1本				【5番目】						