産婦　**【使用不可　レジメン名称**：婦 体部Pembro+Lenvatinib q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)キイトルーダ点滴静注　(100mg)4mL	200mg	200mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 体部Pembro+Lenvatinib q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)キイトルーダ点滴静注　(100mg)4mL 療法名:婦 体部Pembro+Lenvatinib q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 体部Pembro+Lenvatinib q3W 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								