消内　【肝臓癌、胆レジメン名称：消 膵nlpCPT+5FU+LV q2W　　インターバル日数：12 日 基準日：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)オニバイド点滴静注(43mg)10mL	70mg/m2	74mg/m2
05	点滴	(癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」	200mg/m2	240mg/m2
06	バルン型持続注入	(癌)フルオロウラシル注	2400mg/m2	2520mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「ﾀｲﾎｳ」 療法名:消 膵nlpCPT+5FU+LV q2W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1V	【１番目】								
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 膵nlpCPT+5FU+LV q2W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【２番目】								
03	点滴抗癌剤	(癌)オニバイド点滴静注(43mg)10mL 5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ 療法名:消 膵nlpCPT+5FU+LV q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【３番目】								
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 膵nlpCPT+5FU+LV q2W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】								
05	点滴	5% 大塚糖液2ﾎﾟｰﾄ 100mL (癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:消 膵nlpCPT+5FU+LV q2W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【５番目】								
06	バルン型持続注入	大塚生食注2ポート100mL (癌)フルオロウラシル注	1本 0mg	【６番目】								

消内　【肝臓癌、胆レジメン名称：消 膵nlpCPT+5FU+LV q2W　　インターバル日数：12 日 基準日：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注Ｎ(5000U)5ml 療法名:消 膵nlpCPT+5FU+LV q2W バルン型持続注入【薬剤部混合】: ＊点滴時間 46時間で 投与経路:主管より ： 注入器具ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ(3.7m	2ml									