血液　【DLBCL 】　レジメン名称：血 DLBCL R-Bendamustine q3W　　インターバル日数：19 日　基準日：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725　×　0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)トレアキシン点滴静注液 (100mg)4mL	120mg/m2	130mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注「KHK」	375mg/m2	450mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2							
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「ﾀｲﾎｳ」 療法名:血 DLBCL R-Bendamustine q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0.5V 1V	【１番目】								
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 DLBCL R-Bendamustine q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0.5V		【１番目】							
03	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)トレアキシン点滴静注液 (100mg)4mL 療法名:血 DLBCL R-Bendamustine q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】	【２番目】							
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 DLBCL R-Bendamustine q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:側管より	1本	【３番目】								
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注「KHK」 療法名:血 DLBCL R-Bendamustine q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴速度 50mL/h 投与経路:側管より	1本 0mg	【４番目】								
06	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 DLBCL R-Bendamustine q3W	1本	【５番目】								

血液　【DLBCL 】　レジメン名称：血 DLBCL R-Bendamustine q3W　インターバル日数：19 日　基準日：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2							
		点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:側管より										
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 DLBCL R-Bendamustine q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:側管より	1本		【３番目】							