消内　**【肝臓癌、胆レジメン名称**：消 胆道 GCS q2W　　**インターバル日数**：12 日 **基準日**：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ゲムシタビン点滴静注「ﾔｸﾙﾄ」	1000mg/m2	1050mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	25mg/m2	27mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL グラニセトロン静注液(3mg)3ml「NK」 療法名:消 胆道 GCS q2W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ゲムシタビン点滴静注「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:消 胆道 GCS q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:消 胆道 GCS q2W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 1本	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:消 胆道 GCS q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【４番目】								
05	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:消 胆道 GCS q2W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								