消内　【食道癌 】 レジメン名称：消 食道CDDPshort+5FU q3W　　インターバル日数：19 日 基準日：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	80mg/m2	84mg/m2
05	バルン型持続注入	(癌)フルオロウラシル注	4000mg/m2	4200mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1							
01	点滴	ソルデム３A輸液500ml デキサート注射液(6.6mg)2mL パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「ﾀｲﾎｳ」 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:消 食道CDDPshort+5FU q3W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 1.5V 1V 1本	【１番目】								
02	点滴	20%マンニットール注射液 300mL 療法名:消 食道CDDPshort+5FU q3W 点滴: ＊点滴時間 35分で 投与経路:主管より	1本	【２番目】								
03	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:消 食道CDDPshort+5FU q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 400ml	【３番目】								
04	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:消 食道CDDPshort+5FU q3W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】								
05	バルン型持続注入	(癌)フルオロウラシル注 ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注Ｎ(5000U)5ml 生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) 療法名:消 食道CDDPshort+5FU q3W バルン型持続注入【薬剤部混合】: ＊点滴時間 120時間で 投与経路:主管より ： 注入器具ﾊﾞｸｽﾀｰｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ(2ml	0mg 2ml 1本	【５番目】								