呼内　**【非小細胞 】レジメン名称** : 呼 非小細胞CBDCA(q4W)+S-1(2W2R)+Rad　**インターバル日数** : 26 日 **基準日** : Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	3(AUC)	3.2(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL グラニセトロン静注液(3mg)3ml「NK」 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q4W)+S-1(2W2R)+Rad 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q4W)+S-1(2W2R)+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q4W)+S-1(2W2R)+Rad 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								