泌尿　**【尿路上皮 】レジメン名称**：泌 尿路上皮CDDPshort(Weekly)+Rad　**インターバル日数**：5 日　**基準日**：Day 1

**体表面積計算式**:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

**使用する抗がん剤**:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 点滴抗癌剤 | (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 | 40mg/m2 | 42mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | ソルデム３A輸液500ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>グラニセトロン静注液(3mg)3ml「NK」<br>硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml<br>療法名:泌 尿路上皮CDDPshort(Weekly)+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>1.5V<br>1A<br>1本 | 【１番目】 | | | | | | | | |
| 02 | 点滴 | 20%マンニットール注射液 300mL<br>療法名:泌 尿路上皮CDDPshort(Weekly)+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 35分で<br>投与経路:主管より | 1本 | 【２番目】 | | | | | | | | |
| 03 | 点滴抗癌剤 | 大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ<br>(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」<br>療法名:泌 尿路上皮CDDPshort(Weekly)+Rad<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1袋<br>0mg | 【３番目】 | | | | | | | | |
| 04 | 点滴 | ソルデム３A輸液500ml<br>療法名:泌 尿路上皮CDDPshort(Weekly)+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本 | 【４番目】 | | | | | | | | |