血液　【骨髄腫 】 レジメン名称 : 血 骨髄腫 EPD 4~　インターバル日数 : 26 日 基準日 : Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 点滴抗癌剤 | (癌)エムプリシティ点滴静注用 | 20mg/kg | 24mg/kg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>療法名:血 骨髄腫 EPD 4~<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>1A<br>1V | 【１番目】 | | | | | | | | |
| 02 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL<br>療法名:血 骨髄腫 EPD 4~<br>点滴:<br>＊点滴時間 45分で<br>投与経路:主管より | 1本 | 【２番目】 | | | | | | | | |
| 03 | 点滴抗癌剤 | 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL<br>(癌)エムプリシティ点滴静注用<br>注射用水20ml<br>療法名:血 骨髄腫 EPD 4~<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴速度 300mL/h<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg<br>2A | 【３番目】 | | | | | | | | |
| 04 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>療法名:血 骨髄腫 EPD 4~<br>点滴:<br>＊点滴時間 10分で<br>投与経路:主管より | 1本 | 【４番目】 | | | | | | | | |