

呼内 【小細胞】 レジメン名称 : 呼 小細胞CBDCA+ETP+Durva q3W

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

体表面積計算式: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)イミフィンジ点滴静注	1500mg	1500mg
06	点滴抗癌剤	(癌)エトポシド点滴注(100mg)5mL「サト」	80mg/m2	105mg/m2
07	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	5(AUC)	6.3(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3						
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 小細胞CBDCA+ETP+Durva q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【1番目】								
02	点滴抗癌剤	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL (癌)イミフィンジ点滴静注 療法名:呼 小細胞CBDCA+ETP+Durva q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2番目】								
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 小細胞CBDCA+ETP+Durva q3W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】								
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL グラニセトロン静注液(3mg)3mL「NK」 療法名:呼 小細胞CBDCA+ETP+Durva q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A	【4番目】								
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 小細胞CBDCA+ETP+Durva q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0.5V		【1番目】	【1番目】						
06	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)エトポシド点滴注(100mg)5mL「サト」	1袋 0mg	【5番目】	【2番目】	【2番目】						

呼内 【小細胞】 レジメン名称 : 呼 小細胞CBDCA+ETP+Durva q3W

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3						
		療法名:呼 小細胞CBDCA+ETP+Durva q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
07	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 小細胞CBDCA+ETP+Durva q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【6番目】								
08	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 小細胞CBDCA+ETP+Durva q3W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【7番目】								
09	点滴	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 小細胞CBDCA+ETP+Durva q3W 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0.5V		【3番目】	【3番目】						