

呼内 【非小細胞】レジメン名称 : 呼 非小細胞CBDCA+PEM+IPI+NIVO

インターバル日数 : 40 日 基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | | | | | |
|----|-------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+IPI+NIVO 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より | 1本 | | | | 【1番目】 | | | | | |
| 02 | 点滴抗癌剤 | 生食溶解液キットH 50ml (癌) オブジーボ点滴静注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+IPI+NIVO 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より | 1本 0mg | | | | 【2番目】 | | | | | |
| 03 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+IPI+NIVO 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より | 1本 | | | | 【3番目】 | | | | | |
| 04 | 点滴抗癌剤 | 生食溶解液キットH 50ml (癌) ヤーボイ点滴静注液(50mg) 10mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+IPI+NIVO 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より | 1本 0mg | | | | | | | | | |
| 05 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+IPI+NIVO 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より | 1本 | | | | | | | | | |
| 06 | 点滴 | グラニセトロン静注液(3mg) 3ml「NK」 デキサート注射液(6.6mg) 2mL 生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+IPI+NIVO 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より | 1A 1V 1本 | | | | 【4番目】 | | | | | |
| 07 | 点滴抗癌剤 | 大塚生食注2ポート100mL (癌) ペメトレキセド点滴静注液「ト-ワ」 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+IPI+NIVO 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: | 1本 0mg | | | | 【5番目】 | | | | | |

呼内 【非小細胞】レジメン名称 : 呼 非小細胞CBDCA+PEM+IPI+NIVO

インターバル日数 : 40 日 基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | | | | | |
|----|-------|---|-----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | | *点滴時間 10分で 投与経路:主管より | | | | | | | | | | |
| 08 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+IPI+NIVO 点滴抗癌剤【薬剤部混合】 : *点滴時間 60分で 投与経路:主管より | 1本 0mg | | | | 【6番目】 | | | | | |
| 09 | 点滴 | 5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+IPI+NIVO 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より | 1本 | | | | 【7番目】 | | | | | |