

血液 【DLBCL】 レジメン名称 : 血 DLBCL Pola+BR q3W 1st

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

体表面積計算式: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)リツキシマブ [®] BS点滴静注「KHK」	375mg/m2	450mg/m2
07	点滴抗癌剤	(癌)ポライビー点滴静注用	1.8mg/kg	2mg/kg
09	点滴抗癌剤	(癌)トレアキシシン点滴静注液(100mg)4mL	90mg/m2	100mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3						
01	点滴	大塚生食注2ポート100mL 水溶性ハイドロコトシ(100mg)2mL 療法名:血 DLBCL Pola+BR q3W 1st 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1V	【1番目】								
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mLソフトバック (癌)リツキシマブ [®] BS点滴静注「KHK」 療法名:血 DLBCL Pola+BR q3W 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 50mL/h 投与経路:主管より	1本 0mg	【2番目】								
03	点滴	生食溶解液キットH 50mL 療法名:血 DLBCL Pola+BR q3W 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】								
04	点滴	生食溶解液キットH 50mL デキサート注射液(6.6mg)2mL パロノセトロン静注(0.75mg)5mL「タレド」 療法名:血 DLBCL Pola+BR q3W 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0.5V 1V		【1番目】							
05	点滴	生食溶解液キットH 50mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 DLBCL Pola+BR q3W 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0.5V			【1番目】						
06	点滴	生食溶解液キットH 50mL	1本		【2番目】							

血液 【DLBCL】 レジメン名称 : 血 DLBCL Pola+BR q3W 1st

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3						
		療法名:血 DLBCL Pola+BR q3W 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より										
07	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ポライビー点滴静注用 注射用水20ml 療法名:血 DLBCL Pola+BR q3W 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A		【3番目】							
08	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 DLBCL Pola+BR q3W 1st 点滴: *点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本		【4番目】							
09	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌)トレアキシ点滴静注液 (100mg) 4mL 療法名:血 DLBCL Pola+BR q3W 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 0mg		【5番目】	【2番目】						
10	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 DLBCL Pola+BR q3W 1st 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:側管より	1本		【6番目】	【3番目】						