

泌尿 【尿路上皮】レジメン名称 : 泌 尿路上皮MVACshort q4W

インターバル日数 : 26 日 基準日 : Day 1

体表面積計算式: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
04	点滴抗癌剤	(癌)メソトレキセート	30mg/m2	32mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)エクザール注10mg	3mg/m2	3.2mg/m2
07	点滴抗癌剤	(癌)ドキシソルピシン塩酸塩注射用「NK」	30mg/m2	32mg/m2
11	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」	70mg/m2	74mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮MVACshort q4W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【1 番目】								
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「タレウ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮MVACshort q4W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1V		【1 番目】							
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液(3mg)3mL「NK」 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮MVACshort q4W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V									
04	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌)メソトレキセート 療法名:泌 尿路上皮MVACshort q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2 番目】								
05	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌)エクザール注10mg 療法名:泌 尿路上皮MVACshort q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】:	1本 0mg		【2 番目】							

泌尿 【尿路上皮】レジメン名称 : 泌 尿路上皮MVACshort q4W

インターバル日数 : 26 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
		*点滴時間 5分で 投与経路:主管より										
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:泌 尿路上皮MVACshort q4W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本		【3番目】							
07	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ドキシソルピシン塩酸塩注射用「NK」 療法名:泌 尿路上皮MVACshort q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg		【4番目】							
08	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:泌 尿路上皮MVACshort q4W 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本		【5番目】							
09	点滴	ソルデム 3A輸液500ml 硫酸Mg 補正液(20mEq) 20ml 療法名:泌 尿路上皮MVACshort q4W 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 1本		【6番目】							
10	点滴	20%マンニトール注射液 300mL 療法名:泌 尿路上皮MVACshort q4W 点滴: *点滴時間 35分で 投与経路:主管より	1本		【7番目】							
11	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」 療法名:泌 尿路上皮MVACshort q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	400ml 0mg		【8番目】							
12	点滴	ソルデム 3A輸液500ml 療法名:泌 尿路上皮MVACshort q4W 点滴:	1本		【9番目】							

