

乳腺 【使用】 レジメン名称 : 乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8)

インターバル日数 : 26 日 基準日 : Day 1

体表面積計算式: 体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL	200mg	200mg
06	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルNK	90mg/m2	95mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本								【1番目】	
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL 療法名:乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg								【2番目】	
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8) 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本								【3番目】	
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL 療法名:乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V 1A	【4番目】							【4番目】	
05	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8) 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【5番目】							【5番目】	
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルNK 療法名:乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8)	1本 0mg	【6番目】							【6番目】	



乳腺 【使用】 レジメン名称 : 乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8)

インターバル日数 : 26 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL 療法名:乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8) 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL 療法名:乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V 1A						【4番目】			
05	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8) 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本						【5番目】			
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルNK 療法名:乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【6番目】			
07	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX (3W1R)+Pembro (D8) 点滴:	1本						【7番目】			

