Page: 1/2 期間: Day1∼Day1 消内

【食道瘍 】 レジメン名称・消 食道FOLFOX a2W

印刷日時 2022-06-14 13:15:00

インターバル日数:12 日 **基準日**:Day 1

【及坦河	4	レノバ	ノコか	. 11	及但IULIUN	421

体表面積計算式: 体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 使用する抗がん剤:

机片纹胶·子符 L M

RP	手技	薬剤名称	標準値		上限値	
02	点滴	(癌)レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	$200 \mathrm{mg/m2}$		240 mg/m2	
03	点滴抗癌剤	(癌)オキサリプラチン点滴静注	85 mg/m2	l'	90 mg/m2	
04	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	$400 \mathrm{mg/m2}$].	420 mg/m2	
06	バルン型持続注入	(癌)フルオロウラシル注	$2400 \mathrm{mg/m2}$		$2520 \mathrm{mg/m2}$	
						_
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1		
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本	【1番目	∄ 】	

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL グラニセトロン静注液(3mg)3ml「NK」 療法名:消 食道FOLFOX q2W 点滴: *点滴時間 5分で	1本 1V 1A	【1番目】						
		投与経路:主管より								
02	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	1本 Omg	【2番目】						
	i	THAT I A STORE A STORE	i	I	i	i		ĺ	1 1	l

		点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より						
02	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」療法名:消 食道FOLFOX q2W 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:側管より	1本 Omg	【2番目】				
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)オキサリプラチン点滴静注 療法名:消 食道FOLFOX q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で	1本 Omg	【3番目】				

		(癌)レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 療法名:消 食道FOLFOX q2W 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:側管より	Omg					
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)オキサリプラチン点滴静注 療法名:消 食道FOLFOX q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 Omg	【3番目】				
04	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注 生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 食道FOLFOX q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【4番目】				
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本	【5番目】				

		点流伝名: 何 良道roLrox q2w 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より						
04	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注 生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 食道FOLFOX q2W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	Omg 1本	【4番目】				
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 食道FOLFOX q2W 点滴: *点滴時間 5分で	1本	【5番目】				

 Page: 2/2
 期間: Day1~Day1

 消内
 【食道癌】

【食道癌 】 レジメン名称:消 食道FOLFOX q2W 印刷日時 2022-06-14 13:15:00

インターバル日数:12 日 **基準日**:Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1							
06	バルン型持続注入	大塚生食注2ポート100mL	1本	【6番目】							
		ヘパリンナトリウム注N (5000U) 5ml	2m1								
1		(癌)フルオロウラシル注	Omg								
1		療法名:消 食道FOLFOX q2W									
		バルン型持続注入【薬剤部混合】:									
		*点滴時間 46時間で									
		投与経路:主管より : 注入器具インフューザーポンプ(3.7m									
			•	•	•	•	•	•	•	·	,