消内　**【大腸癌 】 レジメン名称**：消 大腸Cet+Encora+Bini Weekly 2~　**インターバル日数**：5 日　**基準日**：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)アービタックス注(100mg)20ml	250mg/m2	300mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」 療法名:消 大腸Cet+Encora+Bini Weekly 2~ 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A 1A	【１番目】								
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 大腸Cet+Encora+Bini Weekly 2~ 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【２番目】								
03	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)アービタックス注(100mg)20ml 療法名:消 大腸Cet+Encora+Bini Weekly 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【３番目】								
04	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 大腸Cet+Encora+Bini Weekly 2~ 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】								