呼内　**【使用不可　レジメン名称**：呼 非小細胞Treme+Durva q4W　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725　×　0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)イジュド点滴静注 (25mg)1.25mL	75mg	75mg
04	点滴抗癌剤	(癌)イミフィンジ点滴静注	1500mg	1500mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞Treme+Durva q4W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)イジュド点滴静注 (25mg)1.25mL 療法名:呼 非小細胞Treme+Durva q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞Treme+Durva q4W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL (癌)イミフィンジ点滴静注 療法名:呼 非小細胞Treme+Durva q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞Treme+Durva q4W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								