

産婦 レジメン名称 : 婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技    | 薬剤名称                     | 標準値      | 上限値        |
|----|-------|--------------------------|----------|------------|
| 02 | 点滴抗癌剤 | (癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL | 200mg    | 200mg      |
| 04 | 点滴抗癌剤 | (癌)アバスチン                 | 15mg/kg  | 18mg/kg    |
| 08 | 点滴抗癌剤 | (癌)パクリタキセルNK             | 175mg/m2 | 184mg/m2   |
| 09 | 点滴抗癌剤 | (癌)カルボプラチンNK注            | 5 (AUC)  | 5. 3 (AUC) |

| RP | 手技                 | 薬剤名称                                                                                                                | 用量/単位          | Day1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴                 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より                                        | 1本             | 【 1 番目】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 点滴抗癌剤              | 大塚生食注2ポート100mL<br>(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL<br>療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 30分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg      | 【 2 番目】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 点滴                 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W<br>点滴:<br>＊点滴時間 15分で<br>投与経路:主管より                                       | 1本             | 【 3 番目】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 点滴抗癌剤              | 生食注 100mL テルモ<br>(癌)アバスチン<br>療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 90分で<br>投与経路:主管より                  | 1本<br>0mg      | 【 4 番目】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 点滴                 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W<br>点滴:<br>＊点滴時間 45分で<br>投与経路:主管より                                       | 1本             | 【 5 番目】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 点滴<br><br><次ページあり> | 大塚生食注2ポート100mL<br>デキサート注射液 (6. 6mg) 2mL<br>ファモチジン注射液 (20mg) 2mL 「トーワ」                                               | 1本<br>3V<br>1A | 【 6 番目】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

産婦 レジメン名称 : 婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

| RP | 手技    | 薬剤名称                                                                                                         | 用量/単位     | Day1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |       | ポララミン注(5mg)1mL<br>療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W<br>点滴:<br>*点滴時間 10分で<br>投与経路:主管より                                | 1A        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 点滴    | 大塚生食注2ポート100mL<br>パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「タイバ」<br>療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W<br>点滴:<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>1V  | 【 7 番目】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖注500mlソフトバック<br>(癌)パクリタキセルNK<br>療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>*点滴時間 180分で<br>投与経路:主管より  | 1本<br>0mg | 【 8 番目】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖液250ml<br>(癌)カルボプラチンNK注<br>療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:主管より        | 1本<br>0mg | 【 9 番目】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 点滴    | 5%糖液キットH 50mL<br>療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W<br>点滴:<br>*点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より                                  | 1本        | 1 0 番目  |  |  |  |  |  |  |  |  |