耳鼻　**レジメン名称**：耳 頭頸部CBDCA+5FU[FC] q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	5(AUC)	5.3(AUC)
04	バルン型持続注入	(癌)フルオロウラシル注	4000mg/m2	4200mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml グラニセトロン静注液(3mg)3mL「ｻﾜｲ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:耳 頭頸部CBDCA+5FU[FC] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注 5%大塚糖液250ml 療法名:耳 頭頸部CBDCA+5FU[FC] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【２番目】								
03	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:耳 頭頸部CBDCA+5FU[FC] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	バルン型持続注入	(癌)フルオロウラシル注 ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N(5000U)5ml 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 療法名:耳 頭頸部CBDCA+5FU[FC] q3W バルン型持続注入【薬剤部混合】: ＊点滴時間 96時間で 投与経路:主管より	0mg 2ml 1本	【４番目】								