

使用する抗がん剤:												
RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値								
02	点滴抗癌剤	(癌)イミフィンジ点滴静注	1500mg	1500mg								
05	点滴抗癌剤	(癌)ゲムシタビン点滴静注「ヤルト」	1000mg/m2	1200mg/m2								
07	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」	25mg/m2	30mg/m2								
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胆道GC (2W1R)+Durva (q3W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【 1 番目】								
02	点滴抗癌剤	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL (癌)イミフィンジ点滴静注 療法名:消 胆道GC (2W1R)+Durva (q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【 2 番目】								
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胆道GC (2W1R)+Durva (q3W) 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【 3 番目】								
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml グラニセトロン静注液 (3mg) 3mL「サリイ」 デキサート注射液 (6.6mg) 2mL 療法名:消 胆道GC (2W1R)+Durva (q3W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V	【 4 番目】							【 1 番目】	
05	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ゲムシタビン点滴静注「ヤルト」 療法名:消 胆道GC (2W1R)+Durva (q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【 5 番目】							【 2 番目】	
06	点滴 <次ページあり>	大塚生食注 500mL ソフトバッグ 硫酸M g 補正液 (20mEq) 20ml	1袋 1本	【 6 番目】							【 3 番目】	

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
		療法名:消胆道GC (2W1R)+Durva (q3W) 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
07	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)シスプラチン点滴静注「マルロ」 療法名:消胆道GC (2W1R)+Durva (q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【 7 番目】							【 4 番目】	
08	点滴	ソルデム 3 A輸液500ml 療法名:消胆道GC (2W1R)+Durva (q3W) 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【 8 番目】							【 5 番目】	