

体表面積計算式: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL	200mg	200mg
06	点滴抗癌剤	(癌)エピルビシンNK	90mg/m2	95mg/m2
07	点滴抗癌剤	(癌)エンドキサン注射用	600mg/m2	630mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺EC+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【 1 番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL 療法名:乳 乳腺EC+Pembro q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【 2 番目】								
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺EC+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【 3 番目】								
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml グラニセトロン静注液(3mg)3mL「サリイ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺EC+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1.5V	【 4 番目】								
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺EC+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【 5 番目】								
06	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌)エピルビシンNK 療法名:乳 乳腺EC+Pembro q3W	1本 0mg	【 6 番目】								

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】： ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より										
07	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)エンドキサン注射用 療法名:乳 乳腺EC+Pembro q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】： ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【7 番目】								
08	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺EC+Pembro q3W 点滴： ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【8 番目】								