乳腺　【使用 】　レジメン名称：乳 乳腺EPI+CPA[EC90] q3W　インターバル日数：19 日 基準日：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)エピルビシンNK	90mg/m2	95mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)エンドキサン注射用	600mg/m2	630mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml グラニセトロン静注液(3mg)3mL「ｻﾜｲ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺EPI+CPA[EC90] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1.5V	【１番目】								
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺EPI+CPA[EC90] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【２番目】								
03	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)エピルビシンNK 療法名:乳 乳腺EPI+CPA[EC90] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)エンドキサン注射用 療法名:乳 乳腺EPI+CPA[EC90] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺EPI+CPA[EC90] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【５番目】								