産婦　**レジメン名称**：婦 卵巣CDDPshort+Doxil q4W　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ドキシル注 (20mg)10ml	50mg/m2	53mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	60mg/m2	63mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	5%糖液キットH 50mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 卵巣CDDPshort+Doxil q4W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1.5V	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)ドキシル注 (20mg)10ml 療法名:婦 卵巣CDDPshort+Doxil q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:婦 卵巣CDDPshort+Doxil q4W 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴	ソルデム３A輸液500ml 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「ﾀｲﾎｳ」 療法名:婦 卵巣CDDPshort+Doxil q4W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 1本 1V	【４番目】								
05	点滴	20%マンニットール注射液 300mL 療法名:婦 卵巣CDDPshort+Doxil q4W 点滴: ＊点滴時間 35分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								
06	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:婦 卵巣CDDPshort+Doxil q4W	400ml 0mg	【６番目】								

産婦　**レジメン名称**：婦 卵巣CDDPshort+Doxil q4W　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
07	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:婦 卵巣CDDPshort+Doxil q4W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【７番目】								