

レジメン名称：婦 体部PTX (Weekly) +CBDCA (q 3W)

インターバル日数：19 日 基準日：Day 1

[illegible]

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」 ポララミン注(5mg)1mL 療法名:婦 体部PTX (Weekly) +CBDCA (q 3W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A 1A						【1 番目】			
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液(3mg)3mL 「サリ」 療法名:婦 体部PTX (Weekly) +CBDCA (q 3W) 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1A									
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:婦 体部PTX (Weekly) +CBDCA (q 3W) 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本						【2 番目】			
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルNK 療法名:婦 体部PTX (Weekly) +CBDCA (q 3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【3 番目】			
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:婦 体部PTX (Weekly) +CBDCA (q 3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
06	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:婦 体部PTX (Weekly) +CBDCA (q 3W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
07	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:婦 体部PTX (Weekly) +CBDCA (q 3W)	1本						【4 番目】			

[illegible]