泌尿　**レジメン名称**：泌 尿路上皮CBDCA+PTX q3W　**インターバル日数**：47 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルＮＫ	175mg/m2	184mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	5(AUC)	5.3(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」 ポララミン注(5mg)1mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1A 1V	【１番目】								
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液(3mg)3mL「ｻﾜｲ」 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1A	【２番目】								
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)パクリタキセルＮＫ 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 180分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】								
05	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								