

体表面積計算式: 体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)イジユド点滴静注 (25mg) 1. 25mL	75mg	75mg
04	点滴抗癌剤	(癌)イミフィンジ点滴静注	1500mg	1500mg
09	点滴抗癌剤	(癌) (毒)アブラキサン注100mg	100mg/m2	105mg/m2
11	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	6 (AUC)	6. 3 (AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【 1 番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)イジユド点滴静注 (25mg) 1. 25mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【 2 番目】								
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【 3 番目】								
04	点滴抗癌剤	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL (癌)イミフィンジ点滴静注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【 4 番目】								
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【 5 番目】								
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml グラニセトロン静注液 (3mg) 3mL 「サリイ」 ロキソニン注射液 (6. 6mg) 2mL	1本 1A 1V	【 6 番目】								

13

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

[illegible]

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)イジユド点滴静注 (25mg) 1. 25mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴抗癌剤	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL (癌)イミフィンジ点滴静注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本									
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml グラニセトロン静注液(3mg) 3mL 「サリ」 デキサート注射液(6. 6mg) 2mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V									
07	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6. 6mg) 2mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴:	1本 1V						【1 番目】			

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
		*点滴時間 5分で 投与経路:主管より										
08	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【2 番目】			
09	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)アブラキサン注100mg 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【3 番目】			
10	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本									
11	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
12	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
13	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Treme+Durvaq3 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本						【4 番目】			