

体表面積計算式: 体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌) オブジーボ点滴静注	360mg	360mg
05	点滴抗癌剤	(癌) ペメトレキセド点滴静注液「トｰ」	500mg/m2	525mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌) カルボプラチンNK注	5 (AUC)	5.3 (AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Nivo q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【1 番目】								
02	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌) オブジーボ点滴静注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Nivo q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2 番目】								
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Nivo q3W 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【3 番目】								
04	点滴	大塚生食注2ポート100mL デキサート注射液 (6.6mg) 2mL グラニセトロン静注液 (3mg) 3mL 「サリ」 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Nivo q3W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A	【4 番目】								
05	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌) ペメトレキセド点滴静注液「トｰ」 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Nivo q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【5 番目】								
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌) カルボプラチンNK注	1本 0mg	【6 番目】								

呼内 【非小細胞】レジメン名称：呼 非小細胞CBDCA+PEM+Nivo q3W

インターバル日数：19 日 基準日：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Nivo q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】： ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より										
07	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Nivo q3W 点滴： ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【7 番目】								