脳外　**【使用不可確レジメン名称**：脳 神経膠腫TMZpo+ACNU q4W　　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ニドラン注50mg	40mg/m2	42mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:脳 神経膠腫TMZpo+ACNU q4W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)ニドラン注50mg 注射用水20ml 療法名:脳 神経膠腫TMZpo+ACNU q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:脳 神経膠腫TMZpo+ACNU q4W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								