

産婦 レジメン名称 : 婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL	200mg	200mg
04	点滴抗癌剤	(癌)アバスチン	15mg/kg	18mg/kg
08	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルNK	175mg/m2	184mg/m2
09	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	5 (AUC)	5. 3 (AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【 1 番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL 療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【 2 番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【 3 番目】								
04	点滴抗癌剤	生食注 100mL テルモ (癌)アバスチン 療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【 4 番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W 点滴: ＊点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本	【 5 番目】								
06	点滴 <次ページあり>	大塚生食注2ポート100mL デキサート注射液 (6. 6mg) 2mL ファモチジン注射液 (20mg) 2mL 「トーワ」	1本 3V 1A	【 6 番目】								

産婦 レジメン名称 : 婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		ポララミン注(5mg)1mL 療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1A									
07	点滴	大塚生食注2ポート100mL パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「タイバ」 療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1V	【 7 番目】								
08	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)パクリタキセルNK 療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 180分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【 8 番目】								
09	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【 9 番目】								
10	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:婦 頸部TC+Bev+Pembro q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	1 0 番目								