

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|----|-------|------------------------|----------|----------|
| 04 | 点滴抗癌剤 | (癌)アービタックス注(100mg)20ml | 400mg/m2 | 480mg/m2 |
| 05 | 点滴抗癌剤 | (癌)アービタックス注(100mg)20ml | 250mg/m2 | 300mg/m2 |
| 09 | 点滴抗癌剤 | (癌)パクリタキセルNK | 100mg/m2 | 105mg/m2 |
| 10 | 点滴抗癌剤 | (癌)カルボプラチンNK注 | 2.5(AUC) | 2.7(AUC) |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 |
|----|-----------------------|--|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注射液(20mg)2mL 「トーワ」 療法名:耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 1s 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より | 1本 1V 1A 1A | 【1番目】 | | | | | | | 【1番目】 | |
| 02 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液(3mg)3mL 「サイ」 療法名:耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 1s 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より | 1本 1A | 【2番目】 | | | | | | | 【2番目】 | |
| 03 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL 療法名:耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 1s 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より | 1本 | | | | | | | | | |
| 04 | 点滴抗癌剤 | 大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)アービタックス注(100mg)20ml 療法名:耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 1s 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より | 1袋 0mg | 【3番目】 | | | | | | | | |
| 05 | 点滴抗癌剤 <次ページあり> | 大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)アービタックス注(100mg)20ml 療法名:耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 1s 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で | 1袋 0mg | | | | | | | | 【3番目】 | |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | | | |
|----|----------------|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液 (6.6mg) 2mL ポララミン注 (5mg) 1mL ファモチジン注射液 (20mg) 2mL 「トーワ」 療法名: 耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 1s 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路: 主管より | 1本 1V 1A 1A | | | | | | 【1番目】 | | | |
| 02 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液 (3mg) 3mL 「サリ」 療法名: 耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 1s 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路: 主管より | 1本 1A | | | | | | | | | |
| 03 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL 療法名: 耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 1s 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路: 主管より | 1本 | | | | | | 【2番目】 | | | |
| 04 | 点滴抗癌剤 | 大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)アービタックス注 (100mg) 20ml 療法名: 耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 1s 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で 投与経路: 主管より | 1袋 0mg | | | | | | | | | |
| 05 | 点滴抗癌剤 | 大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)アービタックス注 (100mg) 20ml 療法名: 耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 1s 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路: 主管より | 1袋 0mg | | | | | | 【3番目】 | | | |
| 06 | 点滴 | 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 療法名: 耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 1s 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路: 主管より | 1本 | | | | | | | | | |
| 07 | 点滴 <次ページあり> | 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 療法名: 耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 1s | 1本 | | | | | | 【4番目】 | | | |

